

### Schéma récapitulatif pour les contrôles médicaux, les traitements et la reprise des activités

	0 à 3 mois	3 à 6 mois	7 à 12 mois	18 mois et +	2 ans	3 ans	4 et +
Bilan chez le pédiatre ou le gastroentérologue (au min)	1 x semaine	1x toutes les 2 semaines	1x mois	Tous les 3 mois			
Bilan aux HUG (au min)	X	X	X	X	X	X	X

	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	18 mois	2 ans	3 ans	4 et +
<b>Immunosupresseurs °</b>	Dose selon protocole, traitement selon situation				Traitement à vie			
<b>Prednisone ®</b>	Selon schéma		Plus si indication					
<b>Nexium / oméprazole ®</b>	Avec Prédnisone							
<b>Valcyte ®</b>	6 mois							
<b>Bactrim / Nopil ®</b>	1 an							
<b>Aspirine ®</b>	3 mois	Plus si indication chirurgicale						
<b>Ursofalk ®</b>	1 an				Plus si indication			
<b>Autres traitements</b>	l'amlopipine, la spironolactone, les vitamines, le fer, le magnésium, le calcium ainsi que tous les autres traitements seront prescrits selon les besoins							

° Tacrolimus, everolimus, MMF, ciclosporine

	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	18 mois	2 ans	3 ans	4 et +
<b>Crèche</b>	* 1							
<b>Ecole</b>	* 1							
<b>Sport</b>	* 2 Sans aucune restriction (sauf piscine)							
<b>Mer, piscine privée</b>								
<b>Piscine publique, spa / wellness , lac ou rivière</b>								
* 1	Selon situation							
* 2	6 semaines sans sports intenses ou sport de contact, 3 mois sans trampoline ou trotinette							